

## REGULAR ANTI DIARROICO KG.5



REGULAR ANTI DIARROICO KG.5

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Mangime dietetico per la stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico, per favorire la digestione fisiologica, per vitelli, agnelli, capretti e annutoli NOTE TECNICHE: REGULAR è un mangime dietetico in polvere usato per prevenire e/o curare disordini metabolici a carico dell'apparato gastro - enterico (enteriti alimentari, diarree causate da sbalzi termici repentini). Il prodotto si scioglie facilmente in acqua tiepida e/o nel latte, è estremamente appetibile e può essere utilizzato anche come pasto sostitutivo o per integrare il latte ricostituito. L'efficacia di REGULAR è dovuta dalla sua formulazione (Farina micronizzata di Ceratonia siliqua, Farina di carote essiccate e micronizzate, Polpa di mele essiccata, Flocchi di banana) che è in grado di limitare lo sviluppo di diarree causate da agenti patogeni o da particolari situazioni di stress (sbalzi di temperatura, cambi di alimentazione colostro/latte ricostituito). L'azione astringente e gelificante degli estratti naturali contenuti in REGULAR rendono il prodotto efficace fin dai primi trattamenti, senza intaccare la microflora intestinale dell'animale. ADDITIVI (per kg):

Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo: Vitamina A

3a672a	16.000 UI Vitamina D3	
3a671	3.600 UI Vitamina E	
3a700	1.500 mg Betaina anidra	
3a920	9.500 mg Beta-carotene	
3a160(a)	100 mg COMPONENTI ANALITICI	
(espressi sul T.Q.): Proteina grezza		5,0 %
Grassi grezzi	3,3 % Fibra	
grezza	7,0 % Ceneri	
grezze	15,5 %	
Calcio	0,3 %	
Fosforo	0,2 %	
Sodio	3,5 %	
Cloruri	3,8 %	
Potassio	1,6 %	COMPOSIZIONE:

Carote, Baccelli di carruba essiccati, Flocchi di banana, Destrosio, Polpa di mele essiccata, Bicarbonato di sodio, Cloruro di potassio, Cloruro di sodio. Fonti di carboidrati: Flocchi di banana, Destrosio. INDICAZIONI D'USO: Somministrare in caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti: VITELLI E ANNUTOLI In periodi di rischio: Somministrare 3 misurini\* per litro di latte per 3-4 gg. Gravi disordini intestinali: Sostituire l'alimentazione latte somministrando acqua calda (40°C) con 5 misurini di REGULAR per litro per 2 gg. Successivamente cambiare gradualmente l'alimentazione reinserendo il latte con 3 misurini per litro fino alla risoluzione del disordine intestinale. AGNELLI E CAPRETTI In periodi di rischio: Somministrare 1 misurino\* per litro di latte per 3-4 gg. Gravi disordini intestinali: Somministrare 2 misurini di REGULAR per litro di latte per 3-4 gg. \*1 misurino equivale a 20 grammi di prodotto Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario o di un tecnico nutrizionista prima dell'uso.