

## TRICALCIUM BOLO PZ. 1 ( cf DA 20 pz. )



ABBONA DANIELE S.R.L.



TRICALCIUM BOLO PZ. 1 ( cf DA 20 pz. )

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Mangime complementare minerale per vacche da latte NOTE TECNICHE: L'ipocalcemia determina significative perdite economiche sia in termini di costi diretti a seguito degli interventi sul soggetto debilitato e alla maggiore incidenza di patologie, sia in maniera indiretta a seguito della mancata espressione del potenziale produttivo nell'intera lattazione a venire. La carenza di calcio post-parto compromette infatti la contrazione muscolare, determinando difficoltà al secondamento, atonia e, nei casi più gravi, collasso dell'animale. Tali stati carenziali possono verificarsi con incidenza particolarmente elevata soprattutto in forma subclinica, comunque in grado di compromettere le performance produttive ed esporre ad un maggior rischio di patologie ad essa correlate, quali ad esempio le metriti e la dislocazione abomasale. Maggiormente esposti risultano le vacche pluripare, quelle altamente produttive o con BCS elevato o che hanno avuto parto difficoltoso. La somministrazione di calcio altamente assimilabile in prossimità del parto rappresenta una strategia di riconosciuta efficacia nel limitare insorgenza e gravità di stati di ipocalcemia. A tale scopo è stato appositamente formulato TRICALCIUM, bolo che apporta elevata quantità di calcio da fonti organiche ed inorganiche ad elevata assimilabilità e magnesio, utile a promuovere la contrazione muscolare. ADDITIVI (per kg): Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo: Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671

175.000 UI Conservanti: Formiato di calcio E238  
500.000 mg COMPONENTI  
ANALITICI (espressi sul T.Q.): Calcio \_\_\_\_\_ 18,1 % Fosforo  
\_\_\_\_\_ 0,5 % Magnesio \_\_\_\_\_ 1,1 % Sodio  
\_\_\_\_\_ 5,5 %

COMPOSIZIONE: Sorbitolo, Solfato di calcio, Fosfato bicalcico (idrogenortofosfato di calcio), Ossido di magnesio, Sali di magnesio dell'acido stearico (magnesio stearato), Saccarosio INDICAZIONI D'USO: Somministrare 2 boli al momento del parto. In caso di soggetti ad elevato rischio di ipocalcemia (es. BCS elevato, pluripare, picco di lattazione precoce o animali estremamente produttivi nella lattazione precedente etc.) o in caso di necessità, si consiglia un'ulteriore somministrazione di due boli a 12-24 ore dal parto.